

# Apiguard

## *abbinato ad alimentazione stimolante*

Strumenti da utilizzare:	//
Prodotto da utilizzare:	<b>Apiguard (gel in vaschetta da 50 g che contiene 12,5 g di timolo) Candito / Sciroppo invertito</b>
Dosaggio:	<b>Nr.2 vaschette di Apiguard da 50 g Kg 1,25 di candito/sciroppo invertito</b>
Meccanismo di azione:	<b>Inalazione</b>
Giorni di terapia:	<b>28 gg</b>



### ✓ **Giorno 0**

**Applicazione vaschetta di Apiguard come da indicazioni del produttore  
Somministrazione di candito/sciroppo invertito**

### ✓ **Giorno 14**

**Sostituzione della vaschetta di Apiguard**

### ✓ **Giorno 28**

**Ritiro della vaschetta di Apiguard**

*La somministrazione del candito in contemporanea con la terapia a base di timolo è motivata dalla necessità di favorire la distribuzione del principio attivo all'interno dell'alveare attraverso la stimolazione garantita dal candito, migliorando l'efficacia del trattamento. Prove di campo hanno evidenziato anche una minore sofferenza delle api che tollerano meglio la terapia.*

*La vaschetta e la nutrizione, come da foto, vanno appoggiati con l'apertura verso l'alto (vaschetta) o verso il basso (la busta di nutrimento), sopra le traverse dei telaini. L'arnia va chiusa con il coprifavo rovesciato per facilitare il meccanismo di azione del timolo.*



### LOTTA TERRITORIALE

L'inizio della terapia deve avvenire in un intervallo di tempo tra il 15 ed il 31 luglio

**info@eApis.it**

**Campobasso 0874 412464**

**Isernia 0865 927211**

**Caserta 339 9917360**

**Napoli 344 0931865**

**Roma 331 7799891**

**ECOVAR**  
CONTROLLO ECOCOMPATIBILE DELLA VARROASI

